

PROTEXIN BALANCE[®]

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen a készítmény körültekintő, előírás szerű alkalmazása. Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

Nyilvántartási szám:

OGYI - 974/2006

Csomagolási egység:

10 db / 60 db / 500 db kapszula / doboz

Forgalombahozatali engedély jogosultja:

Probiotics International Ltd
Lopen Head, Somerset,
TA13 5JH, Egyesült Királyság

Magyarországon forgalmazza:

VitaminKosár Kft.
1117 Budapest, Nádorliget u. 7/c

Protexin Balance[®] (Probiotics International Ltd.)

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását szakirodalmi adatok igazolják. Hatóanyagai olyan probiotikus baktériumok, melyek az egészséges szervezet bélflórájának összetevői.

Mi a készítmény hatóanyaga?

100 millió (108 db) élő probiotikus baktérium csíra: 1,20 mg Lactobacillus paracasei; 1,05 mg Lactobacillus rhamnosus; 0,30 mg Streptococcus thermophilus; 0,15 mg Lactobacillus acidophilus; 0,14 mg Bifidobacterium breve; 0,14 mg Bifidobacterium longum; 0,03 mg Lactobacillus bulgaricus / kapszula.

Mit tartalmaz a készítmény?

A kapszula prebiotikumként 97% Frukto-oligoszacharidot, vivőanyagként magnézium-sztearátot tartalmaz. Kapszulahéj: hipromellóz.

Mikor ajánlott a készítmény szedése?

Az egészséges, normális bélflóra fenntartása. A bélflóra helyreállítása (pl. antibiotikus kezelések idején és azt követően hasmenés alatt és után). Puffadás megszüntetése. A meggyengült immunrendszer erősítése, klímaváltozáskor, utazáskor és stresszhelyzetekben.

Mikor nem szabad a készítményt alkalmazni?

A készítmény bármely összetevőjével szembeni egyéni túlérzékenység esetén.

Szedhetik-e gyermekek a készítményt?

A készítmény 12 éves kor feletti gyermekek részére javasolt.

Szedhető-e a készítmény más gyógyszerekkel együtt?

A tejsavbaktériumok érzékenyek az elterjedten alkalmazott antibiotikumokkal szemben. Ezért legalább 3 óra teljen el az antibiotikum és a Protexin Balance bevétele között.

Mit kell megfontolni a várandósság és szoptatás ideje alatt?

Alkalmazása előtt kérje ki orvosa véleményét.

Hogyan és milyen adagolásban kell a készítményt szedni?

Naponta két alkalommal, főétkezés-kor egy-egy kapszulát bő folyadékkal vegyünk be.

Milyen nem kívánt hatásokat válthat ki a készítmény?

A készítmény alkalmazása során mellékhatás megjelenése nem ismeretes.

Mire kell még ügyelni

a készítmény alkalmazása során?

Az immunrendszer zavarára visszavezethető bizonyos betegségek (ún. autoimmun betegségek), valamint fennálló súlyos gyomor-bélbetegségek (pl. Crohn-betegség, gyomor-bélrendszeri fekélyek és tumorok) esetén csak előzetes orvosi javallat esetén szedhető a készítmény. A készítményt gyermekek előtt gondosan el kell zárni.

Mennyi ideig szedhető a készítmény?

A termék időkorlátozás nélkül, megelőzőként is alkalmazható.

Hogyan kell tárolni a készítményt?

Legfeljebb 25°C-on, nedvességtől védve tárolandó.