

PROTEXIN RESTORE®

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen a készítmény körültekintő, előírás szerű alkalmazása. Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

Nyilvántartási szám:

OGYI-975/2006

Csomagolási egység:

6x1 g / 16x1 g / 100x1 g / por / tasak

Forgalombahozatali engedély jogosultja:

Probiotics International Ltd
Lopen Head, Somerset,
TA13 5JH, Egyesült Királyság

Magyarországon forgalmazza:

VitaminKosár Kft.
1117 Budapest, Nádorliget u. 7/c

Protexin Restore®

(Probiotics International Ltd.)

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, hatását szakirodalmi adatok igazolják. Hatóanyagai olyan probiotikus baktériumok, melyek az egészséges szervezet bélflórájának összetevői. Különösen csecsemők és kisgyermek sérült bélflórájának helyreállítására ajánlott.

Mi a készítmény hatóanyaga?

1 milliárd (10⁹ db) élő probiotikus baktérium csíra: 4,0 mg Lactobacillus paracasei; 3,5 mg Lactobacillus rhamnosus; 1,0 mg Streptococcus thermophilus; 0,5 mg Lactobacillus acidophilus; 0,5 mg Bifidobacterium breve; 0,4 mg Bifidobacterium infantis; 0,1 mg Lactobacillus bulgaricus / tasak.

Mit tartalmaz a készítmény?

A tasak prebiotikumként 99% fruktó-oligosaccharidot tartalmaz.

Mikor ajánlott a készítmény szedése?

Csecsemők és kisgyermek kúraszerű bélfóra-helyreállító kezelésére, így antibiotikus kezelés alatt és azt követően, hasmenések esetén, puffadás megszüntetésére, és olyan esetekben amikor a meggyengült immunrendszer erősítése indokolt (klímaváltozás, utazás, egyéb stresszhelyzetek).

Mikor nem szabad a készítményt alkalmazni?

A készítmény bármely összetevőjével szembeni egyéni túlérzékenység, valamint az immunrendszer zavarai (pl. HIV-fertőzés) esetén nem javasolt a fogyasztása.

Hány éves kortól szedhetik gyermekek a készítményt?

A készítmény szedése csecsemő kortól javasolt.

Szedhető-e a készítmény más gyógyszerekkel együtt?

Egyes gyógyszerek (pl. antibiotikumok) csökkenthetik a készítmény hatékonyságát, ezért a Protexin Restore és egyéb gyógyszer bevétele között legalább 3 óra teljen el.

Mit kell megfontolni a várandósság és szoptatás ideje alatt?

Alkalmazása előtt kérje ki orvosa véleményét.

Hogyan és milyen adagolásban kell a készítményt szedni?

Napi egy tasak főétkezéskor vagy étkezés után, bő folyadékkal. A tasak tar-

talma ételhez, vízhez, tejhez vagy gyümölcsleveshez egyaránt hozzákeverhető.

Milyen nem kívánt hatásokat válthat ki a készítmény?

Egészséges immunrendszerű csecsemőknél és kisgyermekknél a készítmény alkalmazása során mellékhatás megjelenése nem ismeretes. Egy koraszülöttnél történt alkalmazás után a készítményben található egyik baktériumot kimutatták a csecsemő véréből (bakterémia).

Mire kell még ügyelni a készítmény alkalmazása során?

Éretlen immunrendszerű csecsemők (pl. koraszülöttek), továbbá az immunrendszer zavarára visszavezethető bizonyos betegségek (ún. autoimmunbetegségek), valamint fennálló súlyos gyomor-bélbetegségek (pl. Crohn-betegség, gyomor-bélrendszeri fekélyek és tumorok) esetén csak előzetes orvosi javallat esetén szedhető a készítmény. A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Mennyi ideig szedhető a készítmény?

Egy kúra időtartama legalább 5 nap, és általában 15 napnál hosszabb alkalmazás nem szükséges.

Hogyan kell tárolni a készítményt?

Legfeljebb 25°C-on, nedvességtől védve tárolandó.